



**MONITOREO DE AVANCES
EN MATERIA DE
LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES 2020**



**Organización
Mundial de la Salud**

**MONITOREO DE AVANCES
EN MATERIA DE LAS
ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES 2020**

Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020
[Noncommunicable diseases progress monitor 2020]

ISBN 978-92-4-000261-6 (versión electrónica)
ISBN 978-92-4-000262-3 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud 2020

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la OMS refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse la siguiente nota de descarga junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no es obra de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Forma de cita propuesta. Informe sobre el seguimiento de los progresos en relación con las enfermedades no transmisibles 2020 [Noncommunicable diseases progress monitor 2020]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catálogo (CIP): Puede consultarse en <http://apps.who.int/iris>.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, véase <http://apps.who.int/bookorders>. Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase <http://www.who.int/about/licensing>.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descarga generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OMS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Printed in Switzerland.

Índice

Agradecimientos	iv
Prólogo	v
Introducción	1
Notas explicativas	4
Indicadores de seguimiento de los progresos	4
Demografía	5
Mortalidad	6
Bibliografía	7
Perfiles nacionales	9
Apéndice 1: Definiciones y especificaciones de los indicadores	205

Agradecimientos

Han preparado el presente informe Leanne Riley, Melanie Cowan y Marie Clem Carlos de la Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Notificación, Departamento de Enfermedades No Transmisibles, Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contribuyeron al informe los siguientes colegas de la sede de la OMS y las oficinas regionales: Naveen Agarwal, Fiona Bull, Roberta Caixeta, May Cho, Alison Commar, Carolina Chavez Cortez, Kaia Engesveen, Heba Fouad, Alexandra Fleischmann, Sophie Genay-Diliautas, Larry Grummer-Strawn, Warrick Junsuk Kim, Doris Ma Fat, Saki Narita, Ghada Nasr, Ivo Rakovac, Nivo Ramanandraibe, Manju Rani, Dag Rekve, Stefan Savin, Donghee Seo, Hai-Rim Shin, Wendy Snowdon, Marcus Stahlhofer, Nola Vanualailai, Cherian Varghese y Temo Waquanivalu.

Nuestro sincero agradecimiento a todos los Estados Miembros de la OMS por su asistencia en la notificación de datos a la OMS, lo que ha permitido la compilación de los indicadores.

Prólogo

En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a reducir en un tercio las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles para 2030. Solo nos quedan 10 años para cumplir ese compromiso. El presente informe sobre el seguimiento nos da una idea de los avances que hemos realizado hacia ese objetivo.

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte prematura en el mundo. Cada año, 41 millones de personas mueren por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, neumopatías crónicas, diabetes o trastornos mentales. Eso supone más del 70% de todas las muertes en todo el mundo, además de unas consecuencias devastadoras para la economía. Así, tomar medidas contra las enfermedades no transmisibles no es solo un imperativo moral, sino un imperativo económico.

De los datos obtenidos de 194 países, llama la atención que únicamente la mitad de ellos haya logrado plenamente tan solo 3 de 10 indicadores. Es un signo poco esperanzador que convierte la presente década en el periodo decisivo para avanzar en la lucha contra las ENT en todos los países.

La OMS ha desarrollado un conjunto de 16 intervenciones prácticas, eficaces y eficientes, llamadas «mejores inversiones», que pueden realizarse a nivel primario. Las intervenciones se centran de forma decisiva en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, e incorporan soluciones como: el aumento de los impuestos sobre el tabaco, la restricción de la publicidad del alcohol, la reformulación de los productos alimenticios para que contengan menos sal, menos azúcar y menos grasa, la vacunación de las niñas contra el cáncer cervicouterino, el tratamiento de la hipertensión y la diabetes, etc.

Las mejores inversiones son un poderoso instrumento económico. Calculamos que por cada dólar invertido en las mejores inversiones se obtendrá un rendimiento de, al menos, siete dólares. Si se aplican a nivel mundial, las mejores inversiones salvarán 10 millones de vidas para 2025 y evitarán 17 millones de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos para 2030.

La atención primaria de la salud, centrada en promover la salud y prevenir enfermedades, es la forma más integradora, eficaz y eficiente de reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y de promover

la salud mental y el bienestar. Además de una robusta atención primaria de salud, los países necesitan tener redes sólidas de consultorios con otros niveles de cuidados.

Ahora bien, también tenemos que trabajar en cuestiones ajenas al sector sanitario para hacer frente a las causas fundamentales de las ENT: los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y las condiciones en las que vivimos, trabajamos y jugamos. Es fundamental aplicar una estrategia en la que participen todas las instancias gubernamentales.

A menudo he dicho que el liderazgo político es indispensable para poder avanzar en la lucha contra las enfermedades no transmisibles y en la promoción de la salud mental. Pero también lo es invertir en atención primaria de la salud, aplicar las mejores inversiones y establecer alianzas creativas con todos los sectores.

Todos los países se ven afectados por la epidemia de las ENT. Debemos dar prioridad a la promoción de la salud, la prevención y la gestión de las enfermedades. Y la mejor manera de hacerlo es mediante una fuerte atención primaria de salud. Sabemos lo que tenemos que hacer para luchar contra las ENT.

Por lo tanto, no se trata de si los países pueden permitirse aplicar las mejores inversiones, sino de si pueden permitirse no hacerlo. Tenemos todos los elementos necesarios para salvar vidas, solo tenemos que ponerlos en práctica. La pregunta es, ¿lo haremos? Es una pregunta a la que debemos responder con las decisiones que tomemos todos los días a partir de hoy.

DR TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS

Director General

Organización Mundial de la Salud

Introducción

Las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, son la principal causa de muerte puesto que provocan un poco más del 70% de las muertes en todo el mundo. Las ENT comparten importantes factores de riesgo comportamentales modificables, como el consumo de tabaco, una dieta malsana, la falta de actividad física y el uso nocivo del alcohol, que a su vez causan sobrepeso y obesidad, aumento de la tensión arterial elevada y del colesterol y, finalmente, la enfermedad. Las enfermedades no transmisibles siguen planteando un importante desafío de salud pública en todos los países, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, en los que se registran tres cuartas partes de las muertes por esas enfermedades.

Abordar con eficacia las ENT y sus factores de riesgo requiere un conocimiento profundo de la situación actual y de los progresos logrados en el ámbito de país. Existen intervenciones factibles y costeeficaces para reducir la carga y efectos de las ENT ahora y en el futuro. El seguimiento de la aplicación nacional de un importante conjunto de medidas que hacen de marcador y están vinculadas a estas intervenciones permite establecer referentes mundiales y vigilar los progresos que se realizan en la lucha contra las ENT. También sirve para poner de relieve los retos y los ámbitos que requieren más atención.

En mayo de 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó una nota técnica (1) sobre cómo informaría la OMS en 2017 a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los progresos realizados en la aplicación de los compromisos nacionales incluidos en la Declaración política de las Naciones Unidas de 2011 y el documento final de 2014 sobre las ENT. La nota técnica se actualizó en septiembre de 2017 para garantizar que esté armonizada con el conjunto revisado de «mejores inversiones» y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, refrendadas por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2017. En la nota técnica se recoge un conjunto de 10 indicadores de seguimiento destinados a mostrar los progresos logrados en los países en la aplicación de determinados compromisos nacionales incluidos en el documento final de 2014. Los 10 indicadores de seguimiento de los progresos en relación con las ENT son los siguientes:

Considerar la posibilidad de establecer metas nacionales en materia de ENT para 2025:

El Estado Miembro ha establecido metas nacionales sujetas a plazos basadas en las orientaciones de la OMS

El Estado Miembro ha puesto en marcha un sistema para obtener

El Estado Miembro ha llevado a cabo un estudio STEPS o un examen sanitario integral cada cinco años

Reducir los factores de riesgo de las ENT, sobre la base de la orientación que figura en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT:

El Estado Miembro ha aplicado las cinco siguientes medidas de reducción de la demanda indicadas en el CMCT de la OMS con los mejores resultados posibles:

Eliminar la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, lugares públicos y transportes públicos

Promulgar y aplicar una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco



Considerar la posibilidad de elaborar políticas y planes nacionales multisectoriales con el fin de lograr los objetivos nacionales para 2025:

El Estado Miembro tiene en funcionamiento una estrategia o plan de acción nacional de carácter multisectorial que integra las principales ENT y sus factores de riesgo compartidos

Reducir la asequibilidad de los productos de tabaco aumentando los impuestos especiales y los precios

Utilizar un empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes en todos los paquetes de tabaco

Realizar campañas eficientes a gran escala a través de los medios de comunicación para educar al público acerca de los daños causados por el hábito de fumar, el consumo de tabaco y el humo de tabaco ajeno

El Estado Miembro ha aplicado, según proceda, de acuerdo con las circunstancias nacionales, las siguientes tres medidas para reducir el uso nocivo del alcohol, de conformidad con la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo de alcohol:

Promulgar y aplicar prohibiciones o restricciones integrales a la exposición a la publicidad del alcohol (en diferentes tipos de medios de comunicación)

El Estado Miembro ha puesto en marcha las siguientes cuatro medidas para reducir los regímenes alimentarios poco saludables:

El Estado Miembro ha aplicado recientemente al menos un programa nacional de sensibilización y motivación pública sobre actividad física, en particular campañas en los medios de comunicación para promover un cambio de comportamiento en relación con la actividad física

Fortalecer los sistemas de salud para luchar contra las ENT mediante una atención primaria de la salud y una cobertura sanitaria universal centradas en las personas, sobre la base de la orientación que figura en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT:



Promulgar y aplicar restricciones a la disponibilidad física de alcohol al por menor (reduciendo los horarios de venta)

Aumentar los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas

Adoptar políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la población

Adoptar políticas nacionales que limiten los ácidos grasos saturados y eliminar de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans producidos industrialmente

El conjunto de recomendaciones de la OMS sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños

Legislación/reglamentos para la plena aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

El Estado Miembro tiene directrices, protocolos o normas nacionales, reconocidos o aprobados por el gobierno o las autoridades competentes y con fundamento científico, para la atención clínica de las principales ENT mediante el enfoque de la atención primaria de salud

El Estado Miembro provee tratamientos farmacológicos (entre otros, para el control de la glucemia) y asesoramiento a las personas con alto riesgo que lo necesiten para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, haciendo especial hincapié en la atención primaria de salud

Notas explicativas

En el presente informe se brinda información para cada país en relación con sus logros en los indicadores de seguimiento de los progresos en relación con las ENT. Los perfiles incluyen también información sobre la población, el porcentaje y número de muertes por ENT, y el riesgo de muerte prematura por las cuatro clases principales de ENT (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas) - el indicador utilizado para el seguimiento de la meta 3.4, relativa a las ENT, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos presentados en las páginas de los países proceden de diversas fuentes, cada una de las cuales se explica en las siguientes notas.

Indicadores de seguimiento de los progresos

En el apéndice 1 se recogen pormenores sobre los indicadores de seguimiento de los progresos, en particular definiciones, especificaciones, fuentes de datos y criterios de evaluación detallados. Los símbolos siguientes denotan el grado de logro de cada indicador: ● =plenamente logrado, ◐ = parcialmente logrado, ○ = no se ha logrado, «NA» = no se aplica al país por su situación, «DK» = el país contestó «No lo sé» a la pregunta de la encuesta, y «NR» = no hubo respuesta o faltan datos.

La evaluación de los indicadores 1, 3, 4, 7a, 7b, 7c, 8, 9 y 10 se tomó de las respuestas de los Estados Miembros a la encuesta de 2019 sobre la capacidad de los países en materia de ENT. El cuestionario de dicha encuesta fue cumplimentado en una plataforma en línea por los coordinadores para las ENT o colegas designados del Ministerio de Salud o un instituto u organismo nacional en todos los Estados Miembros de la OMS (194 países) entre marzo y junio de 2019. Las preguntas se formularon de manera que se pudiera obtener información objetiva sobre la idoneidad de la capacidad y se pidió a los países que facilitaran información de apoyo a fin de que la OMS pudiera examinarla para validar las respuestas. Cuando se advertían discrepancias entre la respuesta del país y los documentos presentados

para su validación, se remitía al país una solicitud de aclaración para que la examinaran y procedieran a actualizar la respuesta.

Además, la evaluación de los indicadores 7a, 7b y 7c se contrastó con las respuestas recibidas por la OMS en el segundo examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la documentación de apoyo recogida en la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA).

La evaluación del indicador 2, relativo al sistema para generar datos sobre mortalidad, se basó en los datos compilados por la OMS y almacenados en la base de datos de la Organización a través de una solicitud de datos anual sistemática.

La evaluación del indicador 5 se basó en los datos remitidos por los Estados Miembros en 2019 para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo. La evaluación de la OMS se remitió a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

La situación relativa al logro del indicador 6 se basó en las respuestas de los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, a la encuesta mundial de 2019 sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud realizada por la OMS. La Organización examinó y validó las respuestas, posteriormente refrendadas por los Estados Miembros. Ese indicador viene con una nota al pie en aquellos países que no respondieron a esa encuesta de 2019 y de los que, por lo tanto, solo se dispone de datos de la encuesta anterior (2016).

La situación relativa al logro del indicador 7d se basó en el análisis realizado por la OMS, el UNICEF y la IBFAN del ICDC de copias de toda la legislación nacional sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna para la confección del informe titulado: Marketing of breast-milk substitutes: National implementation of the International Code status report (2018).

Demografía

En cada perfil se indican las estimaciones de población de 2016 procedentes del informe World Population Prospects (2) de la División de Población de las Naciones Unidas.

Mortalidad

Se indica el porcentaje y el número total de muertes por ENT en 2015 para todos los países de población superior a 90 000. Los datos proceden de las tasas de mortalidad por todas las causas para 2016, estimadas a partir de las tablas de supervivencia publicadas en las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2018 (3). Para cada país se estimó el número total de muertes por edad y sexo aplicando las tasas de mortalidad a las poblaciones residentes estimadas preparadas por la División de Población de las Naciones Unidas en su revisión de 2016 (2). Se dio preferencia como fuentes de datos a los sistemas de registro civil en los que se indica con suficiente exhaustividad y calidad la información sobre la causa de la muerte. Previamente se había publicado información pormenorizada (4) sobre los métodos para las estimaciones de mortalidad y causas de muerte.

El riesgo de muerte prematura por las ENT estudiadas que se presenta en los perfiles es la probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años de edad por las cuatro clases principales de ENT y se estimó para 2015 utilizando tasas de mortalidad ajustadas a la edad (en grupos etarios de cinco años, por ejemplo 30-34... 65-69, para las personas de 30 a 70 años) de las cuatro categorías principales de ENT combinadas, para cada Estado Miembro (4). Utilizando el método de las tablas de supervivencia, el riesgo de muerte entre las edades exactas de 30 y 70, por cualquiera de las cuatro causas y en ausencia de otras causas de muerte, se calculó mediante la ecuación que figura a continuación. Los códigos CIE utilizados son: enfermedades cardiovasculares: I00-I99, cáncer: C00-C97, diabetes: E10-E14, y enfermedades respiratorias crónicas: J30-J98.

$${}^5M_x = \frac{\text{Muertes totales por las cuatro ENT entre la edad exacta (x) y la edad exacta (x+5)}}{\text{Población total entre la edad exacta (x) y la edad exacta (x+5)}}$$

A continuación las tasas de muertes quinquenales fueron convertidas a la probabilidad de muerte para cada ENT mediante la siguiente fórmula:

$${}^5q_x = \frac{{}^5M_x + 5}{1 + {}^5M_x + 2,5}$$


Finalmente se calculó la probabilidad incondicional de muerte para el grupo de edad de 30 a 70 años:

$${}_{40}q_{30} = 1 - \prod_{x=30}^{65} (1 - {}_1q_x)$$

Bibliografía

1. <http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1>, consultado el 4 de septiembre de 2017.
2. *World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables*. Nueva York, División de Población de las Naciones Unidas, 2017.
3. *World Health Statistics 2018: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018.
4. *WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000-2016*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018.





Perfiles nacionales

Afganistán

34 656 000

Población total

44%

Porcentaje de muertes por ENT

109 500

Número total de muertes por ENT

30%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Albania

2 926 000

Población total

93%

Porcentaje de muertes por ENT

24 300

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Alemania

81 915 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

839 500

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Angola

28 813 000

Población total

27%

Porcentaje de muertes por ENT

61 900

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

1	Metas nacionales en materia de ENT	○
2	Datos de mortalidad	○
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
A	aumento de impuestos especiales y precios	○
B	políticas sobre espacios sin humo	●
C	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
D	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
E	campañas en los medios de comunicación	NR
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
A	restricciones a la disponibilidad física	●
B	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
C	aumento de impuestos especiales	○
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
A	políticas sobre la sal/ sodio	○
B	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	DK
C	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
D	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Antigua y Barbuda

101 000

Población total

82%

Porcentaje de muertes por ENT

530

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Arabia Saudita

32 276 000

Población total

73%

Porcentaje de muertes por ENT

83 100

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Argelia

40 606 000

Población total

76%

Porcentaje de muertes por ENT

144 000

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Argentina

43 847 000

Población total

78%

Porcentaje de muertes por ENT

254 500

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	◐
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Armenia

2 925 000

Población total

93%


Porcentaje de muertes por ENT

26 300

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Australia

24 126 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

142 700

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Austria

8 712 000

Población total

92%

Porcentaje de muertes por ENT

74 400

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Azerbaiyán

9 725 000

Población total

87%

Porcentaje de muertes por ENT

54 100

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Bahamas

391 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

1 800

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Bahrein

1 425 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

2 300

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Bangladesh

163 000 000

Población total

67%

Porcentaje de muertes por ENT

572 600

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Barbados

285 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

2 700

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Belarús

9 480 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

107 500

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Bélgica

11 358 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

94 900

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Belice

367 000

Población total

67%

Porcentaje de muertes por ENT

1 400

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Benin

10 872 000

Población total

36%

Porcentaje de muertes por ENT

35 100

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Bhután

798 000

Población total

69%

Porcentaje de muertes por ENT

3 200

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NA
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NA no es aplicable

Bolivia

(Estado Plurinacional de)

10 888 000

Población total

64%

Porcentaje de muertes por ENT

45 900

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Bosnia y Herzegovina

3 517 000

Población total

94%

Porcentaje de muertes por ENT

36 300

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Botswana

2 250 000

Población total

46%

Porcentaje de muertes por ENT

7 200

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

 plenamente logrado  parcialmente logrado  no se ha logrado

Brasil

207 700 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

975 400

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Brunei Darussalam

423 000

Población total

85%

Porcentaje de muertes por ENT

1 400

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NA
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NA no es aplicable

Bulgaria

7 131 000

Población total

95%

Porcentaje de muertes por ENT

101 300

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Burkina Faso

18 646 000

Población total

33%

Porcentaje de muertes por ENT

52 100

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Burundi

10 524 000

Población total

32%

Porcentaje de muertes por ENT

30 500

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Cabo Verde

540 000

Población total

70%

Porcentaje de muertes por ENT

2 100

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>2 Datos de mortalidad ◐</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ○</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>A aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>B políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>C advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>D prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>E campañas en los medios de comunicación ◐</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>A restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>B prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>C aumento de impuestos especiales ○</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>A políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>B políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○</p> <p>C restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>D restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
---	--

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Camboya

15 762 000

Población total

64%

Porcentaje de muertes por ENT

59 900

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Camerún

23 439 000

Población total

35%

Porcentaje de muertes por ENT

82 700

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>2 Datos de mortalidad ○</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ○</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>A aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>B políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>C advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>D prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>E campañas en los medios de comunicación NR</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†</p> <p>A restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>B prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>C aumento de impuestos especiales ●</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>A políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>B políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○</p> <p>C restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>D restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
---	---

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Canadá

36 290 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

226 200

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Chad

14 453 000

Población total

27%

Porcentaje de muertes por ENT

47 400

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

 1	Metas nacionales en materia de ENT	
 2	Datos de mortalidad	
 3	Encuestas sobre los factores de riesgo	
 4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
 5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
 A	aumento de impuestos especiales y precios	
 B	políticas sobre espacios sin humo	
 C	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
 D	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
 E	campañas en los medios de comunicación	
 6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
 A	restricciones a la disponibilidad física	
 B	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
 C	aumento de impuestos especiales	
 7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
 A	políticas sobre la sal/ sodio	
 B	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
 C	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
 D	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
 8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
 9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
 10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Chile

17 910 000

Población total

85%

Porcentaje de muertes por ENT

92 900

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

China

1 404 000 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

9 259 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

1	Metas nacionales en materia de ENT	●
2	Datos de mortalidad	◐
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
A	aumento de impuestos especiales y precios	◐
B	políticas sobre espacios sin humo	○
C	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
D	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
E	campañas en los medios de comunicación	◐
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
A	restricciones a la disponibilidad física	◐
B	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
C	aumento de impuestos especiales	○
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
A	políticas sobre la sal/ sodio	◐
B	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
C	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
D	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Chipre

1 170 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

7 500

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Colombia

48 653 000

Población total

75%

Porcentaje de muertes por ENT

211 400

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Comoras

796 000

Población total

42%

Porcentaje de muertes por ENT

2 400

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

Congo

5 126 000

Población total

35%

Porcentaje de muertes por ENT

13 300

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Costa Rica

4 857 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

20 500

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Côte d'Ivoire

23 696 000

Población total

37%

Porcentaje de muertes por ENT

102 900

Número total de muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Croacia

4 213 000

Población total

92%

Porcentaje de muertes por ENT

47 600

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Cuba

11 476 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

82 400

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Dinamarca

5 712 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

46 400

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Djibouti

942 000

Población total

44%

Porcentaje de muertes por ENT

3 300

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Dominica

74 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Ecuador

16 385 000

Población total

72%

Porcentaje de muertes por ENT

60 700

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Egipto

95 689 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

511 500

Número total de muertes por ENT

28%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

El Salvador

6 345 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

31 100

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Emiratos Árabes Unidos

9 270 000

Población total

77%

Porcentaje de muertes por ENT

11 600

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Eritrea

4 955 000

Población total

45%

Porcentaje de muertes por ENT

15 500

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Eslovaquia

5 444 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

45 600

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Eslovenia

2 078 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

17 700

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

España

46 348 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

382 700

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Estados Unidos de América

322 200 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

2 474 000

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Estonia

1 312 000

Población total

93%

Porcentaje de muertes por ENT

14 200

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Eswatini

1 343 000

Población total

37%

Porcentaje de muertes por ENT

4 800

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Etiopía

102 400 000

Población total

39%

Porcentaje de muertes por ENT

275 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

 plenamente logrado  parcialmente logrado  no se ha logrado

Federación de Rusia

144 000 000

Población total

87%

Porcentaje de muertes por ENT

1 635 000

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

899 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

5 500

Número total de muertes por ENT

31%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>2 Datos de mortalidad ◐</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ◐</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>A aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>B políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>C advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>D prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>E campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†</p> <p>A restricciones a la disponibilidad física NR</p> <p>B prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR</p> <p>C aumento de impuestos especiales NR</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>A políticas sobre la sal/ sodio ◐</p> <p>B políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○</p> <p>C restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>D restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
---	--

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Filipinas

103 300 000

Población total

67%

Porcentaje de muertes por ENT

446 300

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



1

Metas nacionales en materia de ENT



2

Datos de mortalidad



3

Encuestas sobre los factores de riesgo



4

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT



5

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

A

aumento de impuestos especiales y precios



B

políticas sobre espacios sin humo



C

advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro



D

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio



E

campañas en los medios de comunicación



6

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

A

restricciones a la disponibilidad física



B

prohibiciones de publicidad o restricciones integrales



C

aumento de impuestos especiales



7

Medidas para reducir las dietas malsanas:

A

políticas sobre la sal/ sodio



B

políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans



C

restricciones a la promoción dirigida a los niños



D

restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna



8

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física



9

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC



10

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Finlandia

5 503 000

Población total

93%

Porcentaje de muertes por ENT

49 700

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Francia

64 721 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

488 500

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Gabón

1 980 000

Población total

41%

Porcentaje de muertes por ENT

6 200

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>2 Datos de mortalidad ○</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ○</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>A aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>B políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>C advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>D prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>E campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†</p> <p>A restricciones a la disponibilidad física ○</p> <p>B prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>C aumento de impuestos especiales ●</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>A políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>B políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○</p> <p>C restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>D restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
---	--

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Gambia

2 039 000

Población total

34%

Porcentaje de muertes por ENT

5 300

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Georgia

3 925 000

Población total

94%

Porcentaje de muertes por ENT

53 200

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ○ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Ghana

28 207 000

Población total

43%

Porcentaje de muertes por ENT

94 400

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Granada

107 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

630

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Grecia

11 184 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

104 400

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Guatemala

16 582 000

Población total

59%

Porcentaje de muertes por ENT

47 500

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Guinea

12 396 000

Población total

35%

Porcentaje de muertes por ENT

41 100

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Guinea Ecuatorial

1 221 000

Población total

36%

Porcentaje de muertes por ENT

4 200

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>2 Datos de mortalidad ○</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ○</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>A aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>B políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>C advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>D prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>E campañas en los medios de comunicación NR</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†</p> <p>A restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>B prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>C aumento de impuestos especiales ○</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>A políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>B políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○</p> <p>C restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>D restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
---	---

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Guinea-Bissau

1 816 000

Población total

30%

Porcentaje de muertes por ENT

5 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>2 Datos de mortalidad ○</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ○</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>A aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>B políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>C advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>D prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>E campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†</p> <p>A restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>B prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>C aumento de impuestos especiales ○</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>A políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>B políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○</p> <p>C restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>D restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
---	--

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Guyana

773 000

Población total

68%

Porcentaje de muertes por ENT

4 400

Número total de muertes por ENT

31%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Haití

10 847 000

Población total

57%

Porcentaje de muertes por ENT

52 700

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Honduras

9 113 000

Población total

66%

Porcentaje de muertes por ENT

26 200

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Hungría

9 753 000

Población total

94%

Porcentaje de muertes por ENT

119 200

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

India

1 324 000 000 **63%**

Población total

Porcentaje de muertes por ENT

5 995 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Indonesia

261 100 000

Población total

73%

Porcentaje de muertes por ENT

1 365 000

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Irán (República Islámica del)

80 277 000

Población total

82%

Porcentaje de muertes por ENT

304 400

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Iraq

37 203 000

Población total

55%

Porcentaje de muertes por ENT

103 800

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Irlanda

4 726 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

27 800

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Islandia

332 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

2 000

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Islas Cook

17 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Islas Marshall

53 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Islas Salomón

599 000

Población total

69%

Porcentaje de muertes por ENT

1 900

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Israel

8 192 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

38 200

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Italia

59 430 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

584 700

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Jamaica

2 881 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

15 800

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Japón

127 700 000

Población total

82%

Porcentaje de muertes por ENT

1 080 000

Número total de muertes por ENT

8%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	DK
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Jordania

9 456 000

Población total

78%

Porcentaje de muertes por ENT

28 500

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Kazajstán

17 988 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

127 200

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Kenya

48 462 000

Población total

27%

Porcentaje de muertes por ENT

77 100

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Kirguistán

5 956 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

30 100

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Kiribati

114 000

Población total

64%

Porcentaje de muertes por ENT

510

Número total de muertes por ENT

28%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Kuwait

4 053 000

Población total

72%

Porcentaje de muertes por ENT

8 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Lesotho

2 204 000

Población total

32%

Porcentaje de muertes por ENT

9 700

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Letonia

1 971 000

Población total

92%

Porcentaje de muertes por ENT

25 500

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Líbano

6 007 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

34 700

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Liberia

4 614 000

Población total

31%

Porcentaje de muertes por ENT

11 500

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Libia

6 293 000

Población total

72%

Porcentaje de muertes por ENT

24 200

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Lituania

2 908 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

36 700

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Luxemburgo

576 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

3 500

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Macedonia del Norte

2 081 000

Población total

95%

Porcentaje de muertes por ENT

19 200

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Madagascar

24 895 000

Población total

43%

Porcentaje de muertes por ENT

67 400

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Malasia

31 187 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

113 400

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Malawi

18 092 000

Población total

32%

Porcentaje de muertes por ENT

38 900

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta DK no sabe

Maldivas

428 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

1 100

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Malí

17 995 000

Población total

30%

Porcentaje de muertes por ENT

56 100

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Malta

429 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

3 200

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Marruecos

35 277 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

144 900

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Mauricio

1 262 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

8 900

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Mauritania

4 301 000

Población total

37%

Porcentaje de muertes por ENT

12 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

México

127 500 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

521 800

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Micronesia (Estados Federados de)

105 000

Población total

75%

Porcentaje de muertes por ENT

480

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Mónaco

38 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Mongolia

3 027 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

14 900

Número total de muertes por ENT

30%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Montenegro

629 000

Población total

95%

Porcentaje de muertes por ENT

6 200

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

Mozambique

28 829 000

Población total

27%

Porcentaje de muertes por ENT

69 100

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Myanmar

52 885 000

Población total

68%

Porcentaje de muertes por ENT

291 600

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Namibia

2 480 000

Población total

41%

Porcentaje de muertes por ENT

7 700

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Nauru

11 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Nepal

28 983 000

Población total

66%

Porcentaje de muertes por ENT

121 100

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	◐
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Nicaragua

6 150 000

Población total

76%

Porcentaje de muertes por ENT

22 300

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	DK
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

DK no sabe

Níger

20 673 000

Población total

27%

Porcentaje de muertes por ENT

53 800

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Nigeria

186 000 000

Población total

29%

Porcentaje de muertes por ENT

617 300

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Niue

1 600

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Noruega

5 255 000

Población total

87%

Porcentaje de muertes por ENT

35 600

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ○ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Nueva Zelanda

4 661 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

27 400

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	DK
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Omán

4 425 000

Población total

72%

Porcentaje de muertes por ENT

8 100

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Países Bajos

16 987 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

133 500

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Pakistán

193 200 000

Población total

58%

Porcentaje de muertes por ENT

811 300

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

1	Metas nacionales en materia de ENT	○
2	Datos de mortalidad	○
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
A	aumento de impuestos especiales y precios	●
B	políticas sobre espacios sin humo	●
C	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
D	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
E	campañas en los medios de comunicación	●
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
A	restricciones a la disponibilidad física	●
B	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
C	aumento de impuestos especiales	●
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
A	políticas sobre la sal/ sodio	○
B	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
C	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
D	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Palau

22 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Panamá

4 034 000

Población total

75%

Porcentaje de muertes por ENT

15 200

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Papua Nueva Guinea

8 085 000

Población total

56%

Porcentaje de muertes por ENT

31 400

Número total de muertes por ENT

30%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Paraguay

6 725 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

27 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Perú

31 774 000

Población total

69%

Porcentaje de muertes por ENT

119 400

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Polonia

38 224 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

354 100

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◑
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Portugal

10 372 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

91 800

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ○ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Qatar

2 570 000

Población total

69%

Porcentaje de muertes por ENT

2 700

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Reino Unido

65 789 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

533 100

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

República Árabe Siria

18 430 000

Población total

45%

Porcentaje de muertes por ENT

67 800

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

República Centroafricana

4 595 000

Población total

26%

Porcentaje de muertes por ENT

15 600

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/> NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

República Checa

10 611 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

96 900

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

República de Corea

50 792 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

224 400

Número total de muertes por ENT

8%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

República de Moldova

4 060 000

Población total

90%


Porcentaje de muertes por ENT

42 200

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

República Democrática del Congo

78 736 000

Población total

28%

Porcentaje de muertes por ENT

207 500

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	NR
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta DK no sabe

República Democrática Popular Lao

6 758 000

Población total

60%

Porcentaje de muertes por ENT

28 200

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

República Dominicana

10 649 000

Población total

72%

Porcentaje de muertes por ENT

47 500

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

República Popular Democrática de Corea

25 369 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

186 100

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta DK no sabe

República Unida de Tanzania

55 572 000

Población total

33%

Porcentaje de muertes por ENT

134 600

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

Rumania

19 778 000

Población total

92%

Porcentaje de muertes por ENT

237 300

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Rwanda

11 918 000

Población total

44%

Porcentaje de muertes por ENT

29 100

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Saint Kitts y Nevis

55 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ○ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Samoa

195 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

770

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	NR
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas **NR** no hubo respuesta

San Marino

33 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

San Vicente y las Granadinas

110 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

720

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Santa Lucía

178 000

Población total

82%

Porcentaje de muertes por ENT

1 100

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Santo Tomé y Príncipe

200 000

Población total

55%

Porcentaje de muertes por ENT

620

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Senegal

15 412 000

Población total

42%

Porcentaje de muertes por ENT

39 700

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Serbia

8 820 000

Población total

95%

Porcentaje de muertes por ENT

101 500

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Seychelles

94 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

630

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Sierra Leona

7 396 000

Población total

33%

Porcentaje de muertes por ENT

29 700

Número total de muertes por ENT

30%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Singapur

5 622 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

20 900

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

1	Metas nacionales en materia de ENT	●
2	Datos de mortalidad	●
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
A	aumento de impuestos especiales y precios	●
B	políticas sobre espacios sin humo	●
C	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
D	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
E	campañas en los medios de comunicación	●
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
A	restricciones a la disponibilidad física	●
B	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
C	aumento de impuestos especiales	●
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
A	políticas sobre la sal/ sodio	●
B	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
C	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
D	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Somalia

14 318 000

Población total

24%

Porcentaje de muertes por ENT

40 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Sri Lanka

20 798 000

Población total

83%


Porcentaje de muertes por ENT

118 700

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Sudáfrica

56 015 000

Población total

51%

Porcentaje de muertes por ENT

269 500

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Sudán

39 579 000

Población total

52%

Porcentaje de muertes por ENT

147 100

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Sudán del Sur

12 231 000

Población total

27%

Porcentaje de muertes por ENT

33 100

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ○ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Suecia

9 838 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

82 000

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Suiza

8 402 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

60 700

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input checked="" type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input checked="" type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input checked="" type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input checked="" type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Suriname

558 000

Población total

76%

Porcentaje de muertes por ENT

3 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

DK no sabe

Tailandia

68 864 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

399 100

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Tayikistán

8 735 000

Población total

69%

Porcentaje de muertes por ENT

31 900

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Timor-Leste

1 269 000

Población total

45%

Porcentaje de muertes por ENT

3 300

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Togo

7 606 000

Población total

38%

Porcentaje de muertes por ENT

24 300

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Tonga

107 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

520

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

 plenamente logrado  parcialmente logrado  no se ha logrado

Trinidad y Tobago

1 365 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

9 800

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

Túnez

11 403 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

61 900

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado  parcialmente logrado  no se ha logrado

NR no hubo respuesta

Turkmenistán

5 663 000

Población total

76%

Porcentaje de muertes por ENT

30 100

Número total de muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales



● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Turquía

79 512 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

407 300

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Tuvalu

11 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

Ucrania

44 439 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

578 200

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Uganda

41 488 000

Población total

33%

Porcentaje de muertes por ENT

97 600

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Uruguay

3 444 000

Población total

85%

Porcentaje de muertes por ENT

27 800

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

NR no hubo respuesta DK no sabe

Uzbekistán

31 447 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

143 500

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	◐
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Vanuatu

270 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

980

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Venezuela (República Bolivariana de)

31 568 000

Población total

70%

Porcentaje de muertes por ENT

125 800

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Viet Nam

94 569 000

Población total

77%

Porcentaje de muertes por ENT

424 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Yemen

27 584 000

Población total

57%

Porcentaje de muertes por ENT

98 600

Número total de muertes por ENT

31%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

Zambia

16 591 000

Población total

29%

Porcentaje de muertes por ENT

36 400

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input checked="" type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado parcialmente logrado no se ha logrado

Zimbabwe

16 150 000

Población total

33%

Porcentaje de muertes por ENT

42 900

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT principales

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input checked="" type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

● plenamente logrado ● parcialmente logrado ○ no se ha logrado



Apéndice 1.

Definiciones y especificaciones
de los indicadores



El Estado Miembro ha establecido metas nacionales sujetas a plazos basadas en las orientaciones de la OMS

Definición

El país ha establecido metas nacionales en materia de ENT. Las metas relacionadas con las ENT deberían estar sujetas a plazos y basarse en las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria y el marco mundial de vigilancia de la OMS.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

Este indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta: «¿Existe un conjunto de metas sujetas a plazos para las ENT basadas en las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria del marco mundial de vigilancia de la OMS?», y presenta la documentación de apoyo necesaria. Las metas deben estar sujetas a plazos, basarse en las nueve metas mundiales, y deben abordar la mortalidad por ENT, así como los factores de riesgo en el país y/o los sistemas de salud.

Este indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta: «¿Existe un conjunto de metas sujetas a plazos para las ENT basadas en las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria del marco mundial de vigilancia de la OMS?», pero las metas no abarcan dos de los tres aspectos abordados en las nueve metas mundiales (en particular la mortalidad) o no están sujetas a plazos.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de sus metas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. La OMS confirmará que el documento presentado constituye en efecto un conjunto de metas nacionales contra las ENT que abordan la mortalidad por esa causa, así como otros factores de riesgo importantes en el país, y/o los sistemas de salud, que se basan en las nueve metas mundiales, y que están sujetas a plazos (por ejemplo, incluyen texto como «para 2025»). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha puesto en marcha un sistema para obtener sistemáticamente datos confiables de mortalidad por causas específicas

Definición

El país cuenta con un sistema de registro civil en el que se recogen sistemáticamente las muertes y las causas de muerte. Los encargados de la cumplimentación utilizan el formulario internacional del certificado médico de causas de defunción. Para codificar las causas de defunción se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Los datos compilados se ponen a disposición de los responsables de formular políticas y los investigadores.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

La OMS recopila datos sobre mortalidad, en particular las causas de muerte, de los sistemas de registro civil en la base de datos de mortalidad de la OMS mediante una solicitud de datos anual sistemática. Se considera que los datos permiten obtener sistemáticamente datos confiables de mortalidad por causas específicas si:

- Los datos de los cinco últimos años notificados son, de promedio, aprovechables al menos en un 70%. La aprovechabilidad se calcula del siguiente modo (Exhaustividad (%))*(1 - Proporción de datos inútiles)
- Se han notificado al menos cinco años de datos sobre causas de defunción a la OMS en los 10 últimos años;
- No han pasado más de cinco años desde la última vez que se notificaron datos.

El indicador se considera plenamente logrado si el país cumple todos los criterios anteriores.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país no cumple todos los criterios anteriores pero ha presentado algunos datos de registro civil a la OMS.

Validación de los datos

Los datos presentados se verifican y si se detectan incoherencias se pide a los países que las resuelvan.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Anualmente

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf



El Estado Miembro ha llevado a cabo un estudio STEPS o un examen sanitario integral cada cinco años

Definición

El país ha llevado a cabo un estudio STEPS u otro estudio de factores de riesgo que incluya mediciones físicas y evaluaciones bioquímicas que abarquen los principales factores de riesgo en el comportamiento y el metabolismo para las ENT. El país debe indicar que la frecuencia de la encuesta es al menos quinquenal.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a cada una de las siguientes preguntas en relación con los adultos: «¿Se han realizado en su país encuestas sobre los factores de riesgo (individuales o múltiples) siguientes?:» «Uso nocivo del alcohol» (opcional para los Estados Miembros con prohibición del alcohol), «Inactividad física», «Consumo de tabaco», «Hiperglucemia/diabetes», «Hipertensión arterial», «Sobrepeso y obesidad», e «Ingesta elevada de sal/sodio». Los datos sobre los factores «Hiperglucemia/diabetes», «Hipertensión arterial» y «Sobrepeso y obesidad» deben haberse medido y no proceder del interesado. Además, para cada factor de riesgo el país debe indicar que la última encuesta se realizó en los últimos cinco años (es decir, 2014 o posteriormente para las respuestas a la encuesta de 2019 sobre la capacidad de los países) y debe responder «Cada 1 a 2 años» o «Cada 3 a 5 años» al inciso «¿Con qué frecuencia se realiza la encuesta?». Además, el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país contesta que se abarcan al menos 3 de los factores de riesgo, pero no todos, o que las encuestas se realizaron hace más de 5 años, pero menos de 10.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia del informe (o informes) de las encuestas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia. Los datos también se contrastan con el sistema de seguimiento de STEPS, que registra los detalles de los estudios STEPS realizados por los países.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro tiene en funcionamiento una estrategia o plan de acción nacional de carácter multisectorial que integra las principales ENT y sus factores de riesgo compartidos

Definición

El país tiene una política/estrategia/plan de acción nacional integrado y multisectorial contra las ENT y sus factores de riesgo que aborda las cuatro clases principales de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas) y sus factores de riesgo más importantes (consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y uso nocivo del alcohol).

Por «multisectorial» se entiende que entraña la colaboración con uno o varios sectores gubernamentales distintos del sanitario. «En funcionamiento» se aplica a toda política, estrategia o plan de acción que se ha implantado y se usa en el país y cuenta con los recursos y la financiación necesarios.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Cuenta su país con una política, estrategia o plan de acción nacional contra las ENT que incorpore varias enfermedades no transmisibles, junto con sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es de índole multisectorial?». Además, los países deben responder «En funcionamiento» al inciso «Indique en qué situación se encuentra» y «Sí» a todos los incisos relativos a los cuatro factores de riesgo más importantes y las cuatro clases principales de ENT: «¿Aborda uno o más de los siguientes factores de riesgo importantes?» «Uso nocivo del alcohol» (opcional para los Estados Miembros con prohibición del alcohol), «Dieta malsana», «Inactividad física», «Tabaquismo» (la respuesta a las cuatro debe ser «Sí») y «¿Combina la detección precoz, el tratamiento y la atención de las siguientes enfermedades?: «Cáncer», «Enfermedades cardiovasculares», «Enfermedades respiratorias crónicas» y «Diabetes» (la respuesta a las cuatro debe ser «Sí»). Además el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Cuenta su país con una política, estrategia o plan de acción nacional contra las ENT que incorpore varias enfermedades no transmisibles, junto con sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es de índole multisectorial?». Además, los países deben responder «En funcionamiento» al inciso «Indique en qué situación se encuentra» y «Sí» al menos a dos de los cuatro factores de riesgo más importantes y al menos a dos de las cuatro clases principales de ENT.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política/estrategia/plan de acción cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha aplicado medidas para reducir la asequibilidad de los productos de tabaco aumentando los impuestos especiales y los precios

Definición	El país tiene impuestos totales establecidos a un nivel que constituye más del 75% del precio al por menor de los productos de tabaco.
Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro	<p>Datos remitidos por los gobiernos para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo.</p> <p>Los impuestos totales (incluidos los impuestos especiales, el impuesto sobre el valor añadido/a las ventas, los derechos de importación (si procede) y cualesquiera otros impuestos aplicados) se calculan como un porcentaje del precio del producto de tabaco. Actualmente, este porcentaje se calcula en relación con la marca de cigarrillos más vendida.</p> <p>El indicador se considera plenamente logrado si los impuestos totales aplicados por el país constituyen más del 75% del precio de la marca de cigarrillos más vendida.</p> <p>El indicador se considera parcialmente logrado si los impuestos totales aplicados por el país constituyen entre el 51% y el 75% del precio al por menor de la marca de cigarrillos más vendida.</p>
Validación de los datos	La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.
Frecuencia prevista de la recopilación de datos	Cada dos años
Enlaces al instrumento	<p>http://www.who.int/tobacco/global_report/</p> <p>https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1</p>



El Estado Miembro ha aplicado medidas para eliminar la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, lugares públicos y transportes públicos

Definición

Está prohibido fumar por completo en todos los lugares públicos del país (o al menos el 90% de la población está protegida por leyes integrales sobre espacios sin humo de ámbito subnacional). «Por completo» significa que no está permitido fumar en ningún lugar, sin excepciones, salvo en residencias y lugares interiores que sirven de centros residenciales de larga duración, como cárceles y centros de atención sanitaria y social de larga duración, por ejemplo unidades psiquiátricas y residencias de ancianos. La ventilación y diferentes tipos de salas y/o zonas designadas para fumadores no protegen de los daños del humo de tabaco ajeno. Las únicas leyes que ofrecen protección son las que establecen la prohibición de fumar por completo en todos los lugares públicos.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo se analizan los instrumentos jurídicos.

Se evalúa la legislación para determinar si las leyes sobre espacios sin humo estipulan que los entornos interiores estén por completo libres de humo en todo momento, en todas las instalaciones de los ocho lugares siguientes: centros de atención de salud; centros educativos que no sean universidades; universidades; instalaciones oficiales; oficinas interiores y lugares de trabajo no enmarcados en ninguna otra categoría; restaurantes o instalaciones que sirven principalmente comida; cafeterías, pubs y bares o instalaciones que sirven principalmente bebida; transporte público.

El indicador se considera plenamente logrado si está prohibido fumar por completo en todos los lugares públicos del país (o al menos el 90% de la población está protegida por leyes integrales sobre espacios sin humo de ámbito subnacional).

El indicador se considera parcialmente logrado si de tres a siete lugares públicos mantienen la prohibición de fumar por completo, o la legislación permite que se designen salas de fumadores con estrictos requisitos técnicos en cinco o más lugares.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-1.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha aplicado la utilización de un empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes en todos los paquetes de tabaco

Definición

El país establece la obligatoriedad de utilizar empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes con todas las características apropiadas. Entre las características apropiadas de las advertencias sanitarias gráficas grandes se incluyen las siguientes:

- obligatoriedad de determinadas advertencias sanitarias;
- presencia en cada paquete, así como en todo empaquetado y etiquetado exteriores utilizados en la venta minorista; *décrivant les effets nocifs spécifiques de la consommation de tabac sur la santé* ;
- descripción de efectos perjudiciales concretos del consumo de tabaco en la salud;
- son grandes, claras, visibles y legibles (por ejemplo, colores específicos y tipo de letra y tamaño prescritos);
- rotación de las advertencias sanitarias y/o los mensajes;
- presencia de imágenes o pictogramas; y
- escritas en el idioma principal o (todos) los idiomas principales del país.

Entre las características apropiadas del empaquetado neutro/normalizado se incluyen las siguientes:

- restricciones o prohibiciones al uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional en el empaquetado, excepto los nombres de la marca y del producto, que se han de presentar en un color y tipo de letra normalizados;
- forma, tamaño y materiales normalizados del empaquetado del tabaco; y
- ausencia de publicidad o promoción dentro del empaquetado o del producto de tabaco, o adjuntas a ellos.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Se evalúa la legislación para determinar el tamaño de las advertencias (se establece el tamaño medio de las caras anterior y posterior de los paquetes de cigarrillos para calcular el porcentaje de la superficie total del paquete cubierta por advertencias), así como las características de las advertencias.

El indicador se considera plenamente logrado si el país ha aplicado el empaquetado neutro/normalizado y/o las advertencias sanitarias gráficas grandes, que se definen como las que cubren de media al menos el 50% de las caras anterior y posterior del paquete con todas las características apropiadas enumeradas anteriormente.

El indicador se considera parcialmente logrado si se utilizan advertencias medianas, que se definen como las que cubren de media entre el 30% y el 49% de las caras anterior y posterior del paquete, con algunas o todas las características apropiadas, o advertencias grandes sin algunas de las características apropiadas.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-l.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha promulgado y aplicado una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco

Definición

El país prohíbe todas las formas de publicidad directa e indirecta. Entre las prohibiciones de publicidad directa se encuentran: la televisión y radio nacionales; las revistas y periódicos locales; las vallas publicitarias y la publicidad exterior; el punto de venta. Entre las prohibiciones de publicidad indirecta figuran: la distribución gratuita de productos de tabaco por correo o por otros medios; los descuentos promocionales; la identificación de productos no tabacaleros con nombres de marca de tabaco (extensión de marcas); la utilización de nombres de marca de productos no tabacaleros para productos de tabaco (uso común de marcas); la aparición de marcas de tabaco (inserción de productos) o de productos de tabaco en televisión y/o en películas; y el patrocinio (contribuciones y/o publicidad de contribuciones).

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Se evalúa la legislación para determinar si las leyes prohíben por completo todas las formas de publicidad directa e indirecta, promoción y patrocinio de tabaco.

El indicador se considera plenamente logrado si el país prohíbe todas las formas de publicidad directa e indirecta.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país prohíbe la publicidad en la radio, la televisión y los medios impresos nacionales, pero no todas las formas de publicidad directa y/o indirecta.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha realizado campañas a gran escala a través de los medios de comunicación para educar al público acerca de los daños causados por el hábito de fumar, el consumo de tabaco y el humo de tabaco ajeno

Definición

El país ha realizado una campaña antitabaco a escala nacional a través de los medios de comunicación destinada a apoyar el control del tabaco, de al menos 3 semanas de duración con todas las características apropiadas. Entre las características apropiadas se incluyen las siguientes:

- la campaña formaba parte de un programa integral de control del tabaco;
- antes de la campaña, se realizaron nuevas investigaciones, o se revisaron las existentes, para obtener un conocimiento exhaustivo del público destinatario;
- los materiales de comunicación de la campaña se ensayaron previamente con el público destinatario y se perfilaron en consonancia con los objetivos de la campaña;
- el tiempo de emisión (radio y televisión) y/o las inserciones (vallas publicitarias, publicidad impresa, etc.) se consiguieron o adquirieron utilizando los propios recursos internos de la organización o de un planificador de medios o agencia de publicidad (esta información indica si en la campaña se adoptó una planificación de medios y un proceso de compra exhaustivos para llegar al público destinatario de forma eficaz y eficiente);
- la agencia ejecutora colaboró con periodistas para obtener publicidad o cobertura para la campaña en las noticias;
- se llevó a cabo un proceso de evaluación para valorar la eficacia de la ejecución de la campaña;
- se aplicó un proceso de evaluación de resultados para valorar los efectos de la campaña; y
- la campaña se transmitió por televisión y/o radio.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Las campañas que cumplen los requisitos se evalúan en función de las características apropiadas para determinar si representan el uso de un enfoque de comunicación integral.

El indicador se considera plenamente logrado si el país ha llevado a cabo una campaña con al menos siete características apropiadas, en particular la transmisión por televisión y/o radio.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país ha llevado a cabo una campaña que incluya de una a seis características apropiadas.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-l.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha promulgado y aplicado restricciones a la disponibilidad física de alcohol al por menor (restringiendo los horarios de venta)

Definición

El país cuenta con un sistema de concesión de licencias o un monopolio sobre las ventas al por menor de cerveza, vino y licores.

El país impone restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores en locales de consumo o fuera de ellos por lo que respecta a las horas, días y puntos de venta.

El país ha establecido límites de edad legales para poder adquirir y consumir bebidas alcohólicas.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Los datos se recopilan a través de la encuesta sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud.

El indicador se considera plenamente logrado si:

- existe un sistema de concesión de licencias o un monopolio sobre las ventas al por menor de cerveza, vino y licores;
- existen restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores en locales de consumo o fuera de ellos con respecto a las horas y puntos de venta, y restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores fuera de los locales de consumo con respecto a días de venta; y
- el límite de edad legal para la adquisición y consumo de bebidas alcohólicas está establecido a partir de los 18 años para cerveza, vino y licores.

El indicador se considera parcialmente logrado si hay alguna respuesta positiva a los tres indicadores antedichos, pero no todas.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, responden a la encuesta sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud. La OMS examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados Miembros.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada tres o cuatro años

Enlaces al instrumento

https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha promulgado y aplicado prohibiciones o restricciones integrales a la exposición a la publicidad del alcohol (en diferentes tipos de medios de comunicación)

Definición

El país cuenta con marcos de regulación o corregulación para la publicidad del alcohol por diferentes canales (televisión nacional/pública, televisión comercial/privada, radio nacional, radio local, medios impresos, vallas publicitarias, puntos de venta, cines, internet, redes sociales).

El país cuenta con un sistema de detección de infracciones de las restricciones de comercialización.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Los datos se recopilan a través de la encuesta sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud.

El indicador se considera plenamente logrado si:

- existen restricciones a la publicidad del alcohol para la cerveza, el vino y los licores por todos los canales; y
- existe un sistema de detección de infracciones de las restricciones de comercialización.

El indicador se considera parcialmente logrado si hay restricciones al menos en la televisión nacional/pública, la radio nacional y las vallas publicitarias, pero no existen sistemas de detección de infracciones.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, responden a la encuesta sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud. La OMS examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados Miembros.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada tres o cuatro años

Enlaces al instrumento

https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha aumentado los impuestos especiales aplicados a las bebidas alcohólicas

Definición

El país grava con impuestos especiales la cerveza, el vino y los licores.

El país ajusta el nivel de tributación a la inflación en el caso de las bebidas alcohólicas.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Los datos se recopilan a través de la encuesta sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud.

El indicador se considera plenamente logrado si:

- se aplica un impuesto especial a todas las bebidas alcohólicas (cerveza, vino y licores);
- no existen incentivos o descuentos fiscales para la producción de otras bebidas alcohólicas; y
- se ajusta el nivel de tributación a la inflación en el caso de la cerveza, el vino y los licores.

El indicador se considera parcialmente logrado si existe un impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas como se especifica anteriormente.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, responden a la encuesta sobre los avances hacia la consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud. La OMS examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados Miembros.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada tres o cuatro años

Enlaces al instrumento

https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la población

Definición

El país ha aplicado políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la población, en particular la reformulación de productos alimentarios; la creación de un entorno propicio en las instituciones públicas para que puedan proponerse opciones con menos contenido de sodio; campañas de comunicación y en los medios sociales para impulsar un cambio de comportamiento; y el etiquetado en la parte frontal de los envases.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Aplica su país alguna política para reducir el consumo de sal entre la población?» y a los incisos «¿Va dirigida a: la reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria; a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos servidos en entornos específicos como hospitales, escuelas y lugares de trabajo; a un programa de concienciación pública; al etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases?» (debe haber un «Sí» a la reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria y/o a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos, y un «Sí» a un programa de concienciación pública y al etiquetado nutricional). Además el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Aplica su país alguna política para reducir el consumo de sal entre la población?» y «Sí» al menos a uno de los cuatro incisos «¿Va dirigida a: la reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria; a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos servidos en entornos específicos como hospitales, escuelas y lugares de trabajo; a un programa de concienciación pública; al etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases?».

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales que limitan los ácidos grasos saturados y eliminan de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans producidos industrialmente

Definición

El país ha aplicado una política (o políticas) que limita los ácidos grasos saturados y elimina de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans producidos industrialmente.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a las preguntas «¿Se está aplicando en su país alguna política nacional para reducir la ingesta de ácidos grasos saturados por la población?» y «¿Se está aplicando en su país alguna política nacional para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial (por ejemplo, aceites parcialmente hidrogenados) en los alimentos?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.

Se considera que se ha logrado parcialmente este indicador si el país responde «Sí» a alguna de las anteriores preguntas.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha aplicado el conjunto de recomendaciones de la OMS sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños

Definición

El país ha aplicado una política (o políticas) para reducir los efectos que provoca en los niños la promoción de bebidas no alcohólicas y alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Aplica su país alguna política para reducir los efectos que provoca en los niños la promoción de bebidas no alcohólicas y alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro cuenta con legislación/reglamentos para la plena aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

Definición

El país ha promulgado legislación/reglamentos para la plena aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

La OMS recopila cada dos años copias de todos los textos legislativos y reglamentos sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La OMS solicita periódicamente a los países que presenten copias de sus textos legislativos cuando se produzcan cambios en ellos. También se obtuvieron copias de los textos legislativos a partir del UNICEF y la IBFAN del ICDC y las bases de datos jurídicas (Lexis/Nexis y FAO-LEX), EUR-LEX, boletines oficiales nacionales y motores de búsqueda por internet.

El indicador se considera plenamente logrado si se determina que el país cuenta con medidas jurídicas categorizadas como «plenamente incorporadas a la legislación», lo cual significa que los países han promulgado legislación o adoptado reglamentos, decretos u otras medidas jurídicamente vinculantes que abarcan todas o casi todas las disposiciones del Código y las posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

El indicador se considera parcialmente logrado si se determina que el país cuenta con «un número elevado de disposiciones incorporadas a la legislación» o «pocas disposiciones incorporadas a la legislación», lo cual significa que los países han promulgado legislación o adoptado reglamentos, decretos u otras medidas jurídicamente vinculantes que abarcan muchas o algunas disposiciones del Código y las posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Validación de los datos

La OMS, el UNICEF y la IBFAN del ICDC analizan toda la legislación y reglamentos para determinar qué disposiciones del Código están abarcadas. Las tres organizaciones convienen en una clasificación en función de las disposiciones incluidas.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272649/9789241565592-eng.pdf?ua=1>



El Estado Miembro ha aplicado recientemente al menos un programa nacional de sensibilización y motivación pública sobre actividad física, en particular campañas en los medios de comunicación para promover un cambio de comportamiento en relación con la actividad física

Definición

El país ha aplicado recientemente (en los últimos cinco años) al menos un programa nacional de sensibilización pública sobre actividad física.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la siguiente pregunta: «¿Ha llevado a cabo su país alguna campaña nacional de educación pública y sensibilización sobre la actividad física en los últimos dos años?», y los documentos de apoyo proporcionan pruebas claras de que se han llevado a cabo una o más de las siguientes actividades en los últimos dos años:

1. campaña nacional de educación y sensibilización sobre la actividad física en los medios de comunicación, Y/O
2. iniciativas nacionales para promocionar campañas regionales o multinacionales sobre la actividad física (deportes) destinadas a aumentar la sensibilización y a alentar la participación en la actividad física (por ejemplo, la Semana Europea del Deporte, la Semana del Bienestar en el Caribe), Y/O
3. jornadas periódicas de promoción de la actividad física a lo largo del año, en el marco de otras campañas (por ejemplo, los domingos «sin coches») o claramente vinculadas con jornadas de promoción de la salud (por ejemplo, el Día Mundial del Corazón, el Día Mundial de la Diabetes). Celebrar una sola jornada al año no es suficiente para cumplir este criterio.

Se considera que se ha logrado parcialmente este indicador si los documentos justificativos aportan pruebas de que el país ha puesto en práctica, en los últimos dos años, una o más iniciativas o programas para la comunidad de promoción de la actividad física y/o para mejorar las posibilidades de realizar actividad física en entornos comunitarios (por ejemplo, en escuelas, parques, lugares de trabajo, centros de atención sanitaria), aunque no haya pruebas de la celebración de campañas de educación y sensibilización en los medios de comunicación.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de la documentación del programa y/o un enlace al sitio web del programa cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro tiene directrices, protocolos o normas nacionales, reconocidos o aprobados por el gobierno o las autoridades competentes y con fundamento científico, para la atención clínica de las principales ENT mediante el enfoque de la atención primaria de salud

Definición

Directrices, protocolos o normas nacionales con fundamento científico y aprobadas por el gobierno en relación con la atención clínica (diagnóstico y tratamiento) de las cuatro clases principales de enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador está basado en el número de países que indican que tienen directrices, protocolos o normas nacionales para las cuatro clases de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas).

El indicador se considera plenamente logrado si el país cuenta con directrices, protocolos o normas nacionales para las cuatro clases de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), y facilita la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país cuenta con directrices, protocolos o normas nacionales para al menos dos de las cuatro clases de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), pero no para las cuatro.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de las directrices, protocolos o normas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro provee tratamientos farmacológicos (entre otros, para el control de la glucemia) y asesoramiento a las personas con alto riesgo que lo necesiten para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, haciendo especial hincapié en la atención primaria de salud

Definición

El país provee tratamiento farmacológico (incluido el control de la glucemia en el caso de la diabetes mellitus y el control de la hipertensión teniendo en cuenta todos los riesgos) y asesoramiento a todas las personas que hayan sufrido un ataque cardíaco o cerebral y aquellas con alto riesgo ($\geq 30\%$ o $\geq 20\%$) de sufrir un episodio cardiovascular mortal o no mortal en los próximos 10 años.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es complementada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se basa en el número de países que responden «más del 50%» a la pregunta «¿Qué porcentaje de centros de atención primaria de salud ofrece estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral?». Además, los países deben haber señalado que todos los fármacos que se indican a continuación estaban «generalmente disponibles» en los centros de atención primaria del sector de la salud pública: insulina, aspirina, metformina, diuréticos tiazídicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (al menos uno de los dos), antagonistas del calcio, estatinas y sulfonilurea(s).

El indicador se considera plenamente logrado si el país notifica que más del 50% de los centros de atención primaria de salud ofrecen estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que todos los fármacos enumerados anteriormente están generalmente disponibles en centros de atención primaria del sector de la salud pública.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país notifica que entre el 25% y el 50% de los centros de atención primaria de salud ofrecen estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que todos los fármacos enumerados anteriormente están generalmente disponibles en centros de atención primaria del sector de la salud pública.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, remiten una respuesta oficial a la OMS a través de la encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



**Organización
Mundial de la Salud**

ISBN 9 789240 002616

